

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ НАРКОЗЕ ДЛЯ  
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ С  
ДЕТЬМИ С ВРОЖДЁННЫМ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМОМ.

*Information om bedøvelse til forældre til børn med hyperinsulinisme*



Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ НАРКОЗЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТСЯ С ДЕТЬМИ С ВРОЖДЁННЫМ ГИПЕРИНСУЛИНИЗМОМ.**

В связи с различными процедурами и обследованиями, а также наложением центрального венозного катетера (CVK), вашего ребёнка будут вводить в общий наркоз несколько раз. Ниже следует общая информация, которая имеет отношение к общему наркозу.

### **ГОЛОД:**

#### **ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3-Х ЛЕТ:**

Прекратить давать пищу, а также грудное молоко за 4 часа до наркоза.

Прекратить давать воду и сладкую воду за 2 часа до наркоза.

#### **ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ:**

Прекратить есть за 6 часов до наркоза,

Прекратить пить воду и сладкую воду за 2 часа до наркоза.

### **АЛЛЕГИЯ:**

Для персонала, который даёт наркоз вашему ребёнку, очень важно знать, если ваш ребёнок аллергичен к каким-нибудь медикаментам.

### **ТАК ПРИСХОДИТ ВВЕДЕНИЕ В ОБЩИЙ НАРКОЗ:**

Если ребёнку уже поставлена капельница по приезду в операционную, то усыпляющие медикаменты даются через капельницу, и ребёнок засыпает в течение нескольких секунд. Если ребёнок сидит на коленях у одного из родителей, то надо поддерживать голову ребёнка, так как все мышцы расслабляются во время сна.

Если ребёнок приезжает в операционную без капельницы, то его будут вводить в наркоз при помощи маски с усыпляющим газом. В этом случае усыпает ребёнок не так быстро (30-45 секунд), при этом дети часто бывают беспокойными прежде чем уснут.

Желательно, чтобы родители были с ребёнком до момента, когда ребёнок спит. Как только ребёнок заснул, родители должны покинуть операционную. Родители получают специальную одежду, если процедуры происходят в операционном блоке.

**ПОСЛЕ НАРКОЗА:**

После наркоза ваш ребёнок будет переведён в послеоперационное отделение (СОРА). Очень желательно, чтобы вы были здесь вместе с вашим ребёнком. Мы вам позвоним, как только будем выезжать из операционной по направлению к СОРА.

**ОБ ОПЕРАЦИИ:**

Операция по поводу инсулиномы длится обычно 3-4 часа, иногда дольше. Когда ребёнок уже под наркозом, ему поставят эпидуральный катетер в спину для послеоперационного обезболивания. К катетеру присоединяется электронная помпа с обезболивающим медикаментом.

Во время операции вашему ребёнку также наложат специальный катетер в артерию на кисти руки для измерения артериального давления.

После операции ваш ребёнок будет переведён в детское интенсивное отделение (BRITA) для наблюдения. Здесь вы также можете быть вместе с вашим ребёнком.

Odense Universitetshospital  
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V  
Sdr. Boulevard 29  
5000 Odense C

[www.ouh.dk](http://www.ouh.dk)