

Til patienter og pårørende

Sukkersyge og kontrast

Tabletbehandlet diabetes/sukkersyge og røntgenkontrast i blodåren

Diabetes og kontraststof

Radiologisk Afdeling



Region Syddanmark

Dato: _____

Cpr-nr.: _____

Navn: _____

Undersøgelse: _____

I forbindelse med undersøgelsen har du fået sprøjtet kontrast i en blodåre.

I sjældne tilfælde kan kontrasten påvirke nyrerne hos patienter, som får tabletter, der indeholder stoffet Metformin.

Du skal derfor lade være med at tage tabletterne i de næste 48 timer.

Du skal på første hverdag herefter henvende dig til egen læge og få taget en blodprøve (eGFR/P-Creatinium).

Når svaret foreligger og værdien er i orden, må du genoptage behandlingen.

Vis evt. lægen denne vejledning.

Svaret og besked om genoptagelse af behandling skal du have fra egen læge.

Venlig hilsen
Radiologisk Afdeling

Tlf.: 65 41 21 83

Odense Universitetshospital
Radiologisk Afdeling
Klørvænget 47 . 5550 Odense C
Tlf. 65 41 21 55
Mail via e-Boks på www.ouh.dk/oderadio
www.ouh.dk/radio

www.ouh.dk