

Rekvireringskema Porfyrisygdomme

Skal sendes som sikker post via "Send Digitalt"

Kendt porfyrisygdom i familien Nej Ja Hvis Ja - Hvem og hvilken sygdom: _____		
Patientdata	OBS porfyrisygdom	Porfyripakker og materialeudtag
Prøvetagningstid: _____ Patientens cpr-nr.: _____ Navn: _____ Rekvirent sygehus eller læge: _____ Tlf.nr.: _____ Sikkere-mail: _____ SKS-kode: _____	Neuroviscerale symptomer Sidste 4 dg Tidligere Akutte mavesmerter..... Varighed >12 timer..... Opioidkrævende..... Indlæggelse..... Neurologiske symptomer/fund Hvilke _____ Psykiske symptomer..... Hvilke _____ Andet..... Hvilke _____	Akut porfyripakke 3 x 10 ml koncentreret urin uden tilsætning OG 3 x 1,5 ml afpipetteret plasma (ikke fra gelglas) eller 3 x 4 ml heparinblod (ikke fra gelglas) For brugere af BCC og Labka II: Bestil: U-Porfyrin forstadie, U-Porfyrintype, P- Porfyrintype
	Hudsymptomer Sår/vesikler/fragil hud	Kutan porfyri 3 x 10 ml koncentreret urin uden tilsætning OG 3 x 1,5 ml afpipetteret plasma (ikke fra gelglas) eller 3 x 4 ml heparinblod (ikke fra gelglas) For brugere af BCC og Labka II: Bestil: U-Porfyrintype, P- Porfyrintype
	Akutte smerter i huden efter lyseksponering	Hvis ja indsend <u>også</u> 3 x 3-5 ml EDTA-blod. Bestil Erccs(B)-Protoporfyrin
	Fæces	Fæcesprøve min 5 g (2 spiseskeer) - Ikke nødvendig i den initiale udredning Behov for efterbestilling vil fremgå af det lægekommenterede porfyrisvar For brugere af BCC og Labka II bestil: F-Fæcestype
	Opfølgning kendt porfyrisygdom	
	Diagnose: _____	AIP, VP og HCP: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning Bestil: U-Porfyrin forstadie. NB Hastepøver aftales telefonisk PCT: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning. Bestil: U-Porfyrintype EPP: 3 x 3-5 mL EDTA-blod. Bestil: Erccs(B)-Protoporfyrin

Alt prøvemateriale beskyttes mod lys ved indpakning i alufolie/sølvpapir og opbevares på køl (2-8°C) indtil forsendelse. **Rekvissionsseddel OG prøvemateriale med navn og cpr-nr. indsendes samlet.**

Til patienter der selv sender prøvemateriale:
Påfør prøvetagningstidspunkt på rørene.

Alle prøver skal være modtaget i porfyrilaboratoriet inden 3 døgn efter prøvetagning, dvs. sendes som quickbrev og kun mandag til torsdag